

AValiação e Manejo em Emergências Obstétricas

HEMORRAGIA PÓS-PARTO

HEMORRAGIA PÓS-PARTO
(> 500ml)

Oxigênio por máscara/cateter
Instalar dois acessos venosos de grosso calibre
(16G ou 18G)

Avaliar Causas

ATONIA

Massagem uterina bimanual
Ocitocina: 20 UI em 500ml de
SF 0,9% IV em 10min
Após, 20 UI em 500ml SF IV em 2h

Ergometrina 0,2mg IM* ou
Metilergonovina 0,25mg IM*

Misoprostol 600 a 800mcg
via retal

LACERAÇÕES DE TRAJETO

Fazer revisão de canal de parto

Suturar lacerações
Drenar hematomas
Reposicionar útero invertido

RESTOS PLACENTÁRIOS

Avaliar placenta
Explorar cavidade uterina

Remoção manual de placenta
Curetagem

COAGULOPATIA

Teste do tubo seco, provas de
coagulação, hemograma,
tipagem sanguínea,
prova cruzada

Plasma fresco congelado
Plaquetas
Concentrado de hemáceas

* Derivados do Ergot são contraindicados em hipertensão arterial, cardiopatias, fenômeno de Raynaud e esclerodermia.

Se as medidas anteriores falharem, considerar tratamento cirúrgico: sutura compressiva, ligadura de artérias uterinas, histerectomia, encaminhar para UTI