

FEBRE AMARELA

#FebreAmarela

f /minsaude

t /minsaude

YouTube /MinSaudeBR

Informação para todos, vacina para quem precisa.

Fluxograma para atendimento e detecção precoce em casos suspeitos de febre amarela ou de eventos adversos pós-vacinação (EAPV).



Indivíduo com suspeita de febre amarela ou EAPV

VACINADO contra febre amarela nos últimos 30 dias.

NÃO VACINADO contra febre amarela nos últimos 30 dias.

Sinais/sintomas clínicos:

- Febre.
- Dor de cabeça.
- Mialgia.
- Náuseas, vômitos e/ou dor abdominal.
- Icterícia e/ou hemorragias.

Avaliação clínica de rotina.

SIM

NÃO

Indivíduo doente, com dificuldade de exercer atividades diárias de rotina.

NÃO

SIM

Notificar suspeita de febre amarela e/ou investigar possível evento adverso pós-vacinação caso o paciente tenha sido vacinado nos últimos 30 dias.

- Diagnóstico diferencial para outras doenças.
- Orientações para que o paciente retorne em caso de qualquer agravamento das condições de saúde. (Alerta para os principais sinais/sintomas clínicos).

***Em caso de demora no atendimento, colher material para realização de exames laboratoriais e amostra da vacina usada.**

Estado de saúde requer hospitalização.

Estado de saúde **NÃO** requer hospitalização.

Suspeita de febre amarela ou de evento adverso grave.

- Colher material para exames laboratoriais.
- Orientação para paciente retornar em caso de agravamento das condições de saúde.

Hospitalização do paciente: colher material para exames laboratoriais complementares (se ainda não colhido) e notificar dentro de 24 horas.

***Notificação compulsória e imediata.**

Para mais informações, acesse:
saude.gov.br/febreamarela



Ministério da
Saúde

Governo
Federal