

Unidades que trabalham com Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Aids

Coordenação de DST/Aids

Fones: 225-2900 / 325-4925

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

(Testagem anônima e gratuita para HIV e sífilis)

Fones: 325-6711 / 325-6708

Unidade Mista da Asa Sul

Fones: 242-5522 / 242-5259

Centro de Saúde nº 11 de Brasília (CSB-11)

Fones: 272-3155 / 347-6997 / 273-3962

Centro de Saúde nº 05 do Gama (CSG-01)

Fone: 556-5111

Centro de Saúde nº 01 de Ceilândia (CSC-01)

Fone: 371-4458

Unidade Mista de Taguatinga

Fone: 353-8300

Centro de Saúde nº 01 de Planaltina (CSP-01)

Fone: 389-3412

Centro de Saúde nº 01 de Sobradinho (CSS-01)

Fones: 591-2779 / 591-1829

Centro de Saúde nº 01 do Guará

Fones: 568-3296 / 567-0510

Disque Saúde

Fones: 0800-611997 / 160

**Previna-se. Faça o teste de HIV
no começo da gravidez.
O seu bebê agradece.**



**Secretaria
de Saúde**



**MINISTÉRIO
DA SAÚDE**

**Você tem que passar
amor e carinho para ele.
Não o vírus da Aids.**

**Com o pré-natal, você dá mais
proteção à saúde do seu bebê.**



A maioria das crianças com Aids pega a doença da mãe. Mas quando uma gestante descobre que está contaminada com o vírus da Aids, ela pode reduzir em até 70% o risco de transmitir a doença ao futuro bebê. Nesses casos, a utilização do medicamento adequado durante a gestação, no trabalho de parto e pelo próprio recém-nascido é altamente eficaz. Daí a importância de você fazer o seu teste o quanto antes.

Com o pré-natal, você pode evitar muitos problemas no seu futuro e no de quem você mais vai amar nessa vida.

Neste folheto, você vai encontrar algumas informações importantes de como proteger melhor o seu bebê. Leia com atenção e saiba o que você deve fazer.

A importância do teste

Você já sabe que a Aids é uma doença causada por um vírus chamado HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Sabe também que a doença é contraída em relações sexuais sem camisinha, pelo uso de seringas e agulhas usadas e na transfusão de sangue contaminado.

O que você talvez ainda não saiba é que a mãe pode passar o vírus da Aids para o seu filho em três momentos: durante a gravidez, no parto ou na amamentação.

Por isso, a decisão de fazer o teste gratuito é muito importante, já que é a saúde do seu bebê que está em jogo.

Outro dado interessante, que deve pesar na sua decisão de realizar o teste da Aids, é que muitas pessoas se contaminam e não apresentam os sintomas da doença.

O resultado é revelado somente para você, que pode contar ainda com a orientação de um profissional de saúde.

Onde fazer o teste

O teste da Aids pode ser feito em centros de saúde, hospitais públicos e nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs).

Para saber onde fazer o teste, procure a Secretaria de Saúde ou ligue para o Disque Saúde/Pergunte Aids, pelo 0800-611997 ou 160. A ligação é gratuita.

Dicas para quem tem o vírus da Aids

- ✘ Em primeiro lugar, a pessoa infectada deve iniciar o tratamento o mais depressa possível. Neste caso, o medicamento deve ser tomado durante toda a gravidez e também no parto.
- ✘ O remédio é gratuito e está disponível na rede pública de saúde.
- ✘ Até completar um mês e meio de vida o bebê também deve tomar o medicamento.
- ✘ Como a transmissão também pode acontecer durante a amamentação, mães portadoras do vírus da Aids não devem amamentar. Neste caso, a criança será atendida por um banco de leite, também gratuitamente.