

ATENDIMENTO EM BRASÍLIA

Centro de Saúde nº 8 - ASA SUL
EQS 514/515 - W3 Sul - Fone: 245-2112

Centro de Saúde nº 11 - ASA NORTE
SGAN Q. 905 Lote D, Fone: 274-3155

Centro de Saúde nº 5 - GAMA
Q. 38 - Setor Central - Fone: 556-6478

Centro de Saúde nº 3 - GAMA
EQ 3/5 - Setor Leste - Fone: 556-6689

- Secretaria de Saúde do GDF
- Programa de Planejamento Familiar
- Banco de Leite Materno
Ed. das Pioneiras Socias
Fone: 225-0070

**O ATENDIMENTO É IMEDIATO,
GRATUITO E SIGILOSO**

GRUPO ARCO-ÍRIS
CLS 315 - Bloco C - s/loja 27
CEP = 70.384-530
Fone: (061) 346-3300 FAX 346-9369
DOAÇÕES:
Banco do Brasil Ag. 3477-0
Conta corrente nº 45.164-9
Brasília - DF

**APOIO: PNC-DST/AIDS
MINISTÉRIO DA SAÚDE**

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE COMBATE À AIDS



A MULHER EM TEMPOS DE AIDS



**"Nós já descobrimos a cura e a vacina contra a
AIDS. A cura se chama ESPERANÇA e a
vacina SOLIDARIEDADE"**

Herbet Daniel

1995

A MULHER É DIFERENTE DO HOMEM

"Mulher, bicho esquisito, todo mês sangra".

Rita Lee



NA MULHER OCORRE:

- ◆ Menstruação
- ♥ Gravidez
- ♠ Parto
- ♣ Amamentação

Na mulher as chances de contágio do vírus HIV da AIDS são maiores nas seguintes situações:

☛☯ relação sexual vaginal, quando existem doenças venéreas ou infecções vaginais;

☛♥ durante o período fértil;

☛◆ durante a menstruação.

A mulher contaminada pelo vírus HIV da AIDS, sente problemas ginecológicos como:

- ✓ corrimento, ✓ coceira,
- ✓ ferida no colo do útero,
- ✓ dores no pé da barriga,
- ✓ gonorréia, ✓ tumores,
- ✓ "crista de galo", além de outras manifestações.

FORMAS DE CONTAMINAÇÃO DO VÍRUS HIV, INDEPENDENTE DO SEXO



Através de:

- ☛ agulhas e/ou seringas contaminadas;
- ☛ relações sexuais oral, vaginal ou anal sem proteção;
- ☛ transfusão com sangue ou produtos sangüíneos contaminados;
- ☛ sangue menstrual.

HOMENS E MULHERES DEVEM SABER QUE A RESPONSABILIDADE DE PEGAR AIDS É DE CADA UM.

EXIGIR CAMISINHA É UM DIREITO DE CIDADANIA.

GRAVIDEZ EM TEMPOS DE AIDS

A mulher com AIDS não pode abortar livremente e com segurança, pois o aborto ainda é crime no Brasil.

- ♥ A mulher com o vírus HIV ou com AIDS continua fértil e também sente tesão.
- ♥ Pode ocorrer com a mulher que tem o vírus HIV ou AIDS: parto prematuro, fetos de baixo peso ao nascer, gravidez prolongada.
- ♥ Um grande número de mulheres soropositivas têm filhos também soropositivos.
- ♥ ♠ ♣ Os riscos da mulher contaminada transmitir o vírus HIV para seu filho ocorre na gravidez, durante o parto e no aleitamento.

Jogue aberto nas suas relações sexuais.
O que está em jogo é a sua vida

IMPORTANTE:

Toda mulher deve consultar regularmente o ginecologista para realizar exames preventivos e principalmente esclarecer-se sobre suas dúvidas ginecológicas.