


# FEBRE AMARELA



**VACINE-SE E FIQUE PROTEGIDO POR 10 ANOS**

## O QUE É FEBRE AMARELA?

Doença febril aguda, de gravidade variável, causada por um vírus que compromete vários órgãos, sendo o fígado e os rins os mais atingidos.



## OS SINTOMAS

Primeiro, o doente apresenta dor de cabeça, em seguida aparecem febre alta, calafrios, olhos congestionados, vômitos e icterícia.


Os casos graves apresentam hemorragias, delírios e convulsões, que geralmente levam à morte.

## A TRANSMISSÃO

- A febre amarela silvestre ocorre nas florestas, matas da região amazônica e, ocasionalmente, nas veredas do cerrado.

A transmissão se faz através da picada de mosquitos silvestres (*Haemagogus*) infectados pelo vírus, no ciclo:


Macaco - mosquito - homem.



- A febre amarela urbana ocorre nas cidades.

A transmissão se faz através da picada do *Aedes aegypti* infectado, no ciclo:

Homem infectado - *Aedes aegypti* - homem.



## EXISTE TRATAMENTO?

Não existe tratamento específico para febre amarela.

O tratamento é apenas sintomático.

Se você apresentar alguns desses sintomas, procure a Unidade de Saúde mais próxima da sua residência.

Os casos graves devem ser tratados em Unidade de Terapia Intensiva, porque necessitam de cuidados especiais e assistência médica.

## ELIMINANDO POSSÍVEIS FOCOS

Todos os depósitos que puderem conter água parada, mesmo limpa, como garrafas, pneus, pratos de vasos de plantas, xaxim, bacias e copinhos descartáveis, deverão ser cuidadosamente examinados, pois, qualquer um deles poderá constituir-se em criadouros de mosquito.



## OUTRAS INFORMAÇÕES

A vacina encontra-se disponível nas Unidades de Saúde, na área endêmica e nos serviços de portos, aeroportos e fronteiras em todos os Estados.

### IMPORTANTE


Só com a participação consciente de todos, será possível evitar a reurbanização da febre amarela.

**Participe! Vacine-se!**



Secretaria de Saúde

Fundação Hospitalar  
do Distrito Federal



## COMO PREVENIR

A vacina contra febre amarela é fundamental para que você e sua família não adoeçam. A partir dos 12 meses de idade, deve-se tomar a primeira dose da vacina e um reforço a cada dez anos. Nas áreas de risco, como, por exemplo, na Amazônia, é dada a partir dos 6 meses.

A vacina contra febre amarela, na maioria das vezes, não produz efeitos colaterais. Alguns vacinados podem apresentar dor local, febre, dor muscular e dor de cabeça por 1 ou 2 dias.