


Vacinas do Primeiro Ano de Vida

Vacinar é proteger contra as doenças.




MINISTÉRIO DA SAÚDE
INAN/PROGRAMAS BÁSICOS
SNABS/DIVISÃO NACIONAL DE
EDUCAÇÃO E SAÚDE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL –
INAMPS

AÇÕES BÁSICAS NA ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA

NO PRIMEIRO ANO DE VIDA, A CRIANÇA TEM QUE TOMAR ESTAS VACINAS:



VACINA BCG
A partir do nascimento.

Protege contra as formas graves da **tuberculose**.
É aplicada uma só vez (dose **única**), por meio de injeção no braço direito da criança.




VACINA TRÍPLICE (DPT)
A partir dos 2 meses de idade.

Protege contra a **difteria**, a **coqueluche** e o **tétano**.
É aplicada em 3 doses, por meio de injeção na coxa ou nádega da criança.
O intervalo entre uma dose e outra é de 2 meses.
Um ano depois da terceira dose, a criança toma uma dose de reforço.



VACINA ANTIPÓLIO ORAL
A partir dos 2 meses de idade.

Protege contra a **poliomielite** (paralisia infantil).
É dada em 3 doses, por meio de gotas pingadas na boca da criança.
O intervalo entre uma dose e outra é de 2 meses.
Um ano depois da terceira dose, a criança toma uma dose de reforço.



VACINA ANTI-SARAMPO
A partir dos 9 meses de idade.

Protege contra o **sarampo**.
É aplicada uma só vez (dose **única**) por meio de injeção no braço ou nádega da criança.

A criança só ficará protegida contra a **poliomielite** (paralisia infantil), a **difteria**, a **coqueluche**, o **tétano** e o **sarampo**, se tomar todas as doses das vacinas.

População e serviço de saúde trabalhando juntos para que todas as crianças sejam vacinadas, estarão melhorando a situação de saúde da comunidade.



Se até 1 ano de idade não tiver tomado as vacinas, ela deve ser levada ao centro de saúde em qualquer idade para ser vacinada.