

tomar vacina é
**nascer
de novo.**




Sempre que você levar seu filho ao serviço de Saúde, tenha em mãos o Cartão da Criança. É o documento de saúde dele. E lembre - se:

**QUEM DÁ A VIDA, DÁ A VACINA.
QUEM DÁ A VACINA, DÁ A VIDA.**



Fundação Nacional de Saúde
Programa Nacional de Imunizações
MINISTÉRIO DA SAÚDE



ESQUEMA BÁSICO DE VACINAÇÃO

Essas são as vacinas que toda criança tem que tomar durante o primeiro ano de vida.

IDADE	VACINA	DOENÇAS EVITADAS
AO NASCER	BCG	TUBERCULOSE
2 MESES	DPT (TRÍPLICE)	DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCE
	CONTRA PÓLIO (GOTINHA)	POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL)
4 MESES	DPT (TRÍPLICE)	DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCE
	CONTRA PÓLIO (GOTINHA)	POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL)
6 MESES	DPT (TRÍPLICE)	DIFTERIA, TÉTANO, COQUELUCE
	CONTRA PÓLIO (GOTINHA)	POLIOMIELITE (PARALISIA INFANTIL)
9 MESES	CONTRA SARAMPO	SARAMPO,

Com 1 ano e 3 meses a criança deve voltar ao posto de saúde, para tomar doses de reforço da DPT (Difteria, Tétano e Coqueluche), da Gotinha (contra Pólio) e contra Sarampo.

ATENÇÃO!

Muita gente pensa que se o bebê tem qualquer mal-estar, não pode ser vacinado. Isso não é verdade. Bebês com vômitos, diarreias, gripe, tosse, nariz escorrendo, doenças de pele, e até mesmo desnutridos, prematuros e recém-nacidos de baixo peso **podem e devem** ser vacinados. O importante é não perder a hora da vacina.

Quando um bebê nasce, ele chora. E esse choro é muito bem vindo, é um sinal de vida.

Sempre que você vacinar seu filho, pense que ele está nascendo de novo. Pense no choro dele como um sinal de que vai continuar vivendo. E que esse pequeno sofrimento passageiro não é nada, comparado ao verdadeiro sofrimento de doenças terríveis que podem até matá-lo.

É importante lembrar:

1. TODACRIANÇA DEVE SER VACINADA ANTES DE COMPLETAR UM ANO DE IDADE.
2. É FUNDAMENTAL CONTINUAR VACINANDO TODAS AS CRIANÇAS CONTRA A PÓLIO PARA QUE A PARALISIA INFANTIL NÃO REAPAREÇA NO PAÍS.
3. ESTAMOS ELIMINANDO O SARAMPO COM VACINAÇÕES. PODEMOS CONSEGUIR ISSO ATÉ O ANO 2.000.