

Recomenda-se tomar a vacina com um intervalo mínimo de 10 dias antes da viagem, possibilitando assim a formação de anticorpos, suficiente para proteção contra a doença.

Esta recomendação também vale para viagens a países da América do Sul (Venezuela, Bolívia, Equador, Colômbia e Peru) e países endêmicos da África.

Eliminando



Todos os depósitos que puderem conter água parada, mesmo limpa, como garrafas, pneus, pratos de vasos de plantas, xaxim, bacias e copinhos descartáveis, deverão ser cuidadosamente examinados, pois, qualquer um deles poderá constituir-se em criadouros focos de mosquito.



Mudando semanalmente a água dos vasos de plantas ou substituindo por areia.

UNIDADES DE REFERÊNCIA PARA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AMARELA EM NATAL

DISTRITO NORTE

CS PAJUÇARA
CS VALE DOURADO
CS SOLEDADE II
HOSPITAL STA. CATARINA

DISTRITO SUL

CS NOVA DESCOBERTA
CS PONTE NEGRA
CS CIDADE SATÉLITE


DISTRITO LESTE

C. PED. DO ALECRIM
UM MÃE LUÍZA
CS BRASÍLIA TEIMOSA
FUND. NACIONAL DE SAÚDE - FNS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/MS (FNS)

DISTRITO OESTE

UM CIDADE DA ESPERANÇA
CS FELIPE CAMARÃO
CS CIDADE NOVA
TERMINAL RODOVIÁRIO

Febre Amarela



O que é Febre Amarela?

Doença febril aguda, de gravidade variável, causada por um vírus, que compromete vários órgãos, sendo o fígado e os rins os mais atingidos.

Como se manifesta?



Primeiro, o doente apresenta dor de cabeça, em seguida aparece febre alta, calafrios, olhos congestionados, vômitos e icterícia.




Os casos graves apresentam hemorragias, delírios e convulsões, que geralmente levam à morte.

Como se transmite ?

- A Febre Amarela Silvestre ocorre nas florestas, matas e áreas rurais da região endêmica.

A transmissão se faz através da picada de mosquitos silvestres (*Haemagogus* e *Sabethes*) infectados pelo vírus, no ciclo:


macaco → mosquito → homem



- A Febre Amarela Urbana ocorre nas cidades.

A transmissão se faz através da picada do *Aedes Aegypti* infectado, no ciclo:

Homem infectado → *Aedes Aegypti* → homem



Como prevenir ?

Vacinando-se



A vacina contra Febre Amarela é fundamental para que você e sua família não adoçam.

A partir dos 9 meses de idade deve-se tomar uma dose de vacina e um reforço a cada dez anos. Apenas desta forma você estará protegido contra a doença.

A vacina contra Febre Amarela, na maioria da população não produz efeitos colaterais. Entretanto, observa-se que 2 a 5% dos vacinados podem apresentar dor local, febre, dores musculares e dor de cabeça com duração de 1 a 2 dias.

Informando-se

A vacina encontra-se disponível nas Unidades de Saúde, na área endêmica e nos serviços de portos, aeroportos e fronteiras em todos os Estados.

Ao se deslocar para os estados do Amapá, Amazonas, Acre, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Rondônia, Roraima e Tocantins, não se esqueça de verificar se já tomou a vacina contra Febre Amarela.