

1997

MINISTÉRIO DA SAÚDE



Estadramento Clínico FIGO/INCC

# Câncer Cérvico-uterino

*Edição, distribuição e informações:*

**Instituto Nacional de Câncer (INCA)**

Coordenação de Programas de Controle do Câncer (Pro-Onco)

Av. Venezuela, 134 - Bl. A - 9º andar


Cep: 20081-310 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil

Tel: (021) 263-8565

Fax: (021) 263-8297

e-mail: [evinca@omega.incc.br](mailto:evinca@omega.incc.br)

MINISTÉRIO DA SAÚDE



*Este material faz parte de um conjunto de materiais educativos, elaborados pela Divisão de Educação da Coordenação de Programas de Controle do Câncer (Pro-Onco), do Instituto Nacional de Câncer/Ministério da Saúde.*

*Ele tem como finalidade auxiliar os médicos em sua prática diária, principalmente aqueles que atuam de modo mais direto com a saúde da mulher.*

*Sua apresentação sob a forma de cartaz, bem como as ilustrações e textos, buscam facilitar e agilizar o estadiamento do câncer do colo uterino.*



***O estadiamento correto é o primeiro passo para o sucesso terapêutico.***

***é prevenir!***


***estadiar***

***do que***

***Melhor***

***E o melhor remédio para prevenir o câncer do colo uterino é a informação.***

## Estádio 0




**Carcinoma in situ.**

Carcinoma in situ - lesão limitada ao epitélio.

## Estádio 1

**Carcinoma limitado ao colo. Carcinoma invasor, pré-clínico, diagnosticado apenas pela microscopia.**


1.1 Invasão microscópica mínima do estroma.



1.2 Componente invasor menor ou igual a 5 mm, em profundidade, tomada da base do epitélio, e menor ou igual a 7 mm em extensão horizontal (mensurável macroscopicamente).




1.3 Tumor maior que 5 mm, em profundidade, tomada da base do epitélio, e maior que 7 mm em extensão horizontal (mensurável macroscopicamente).




## Estádio 2

**Carcinoma que se estende além do colo, mas que não atinge a parede pélvica ou o terço inferior da vagina**

2.1 O tumor não invade os paramétrios.




2.2 O tumor invade os paramétrios.




## Estádio 3

**Carcinoma que se estende à parede pélvica e/ou compromete o terço inferior da vagina e/ou causa hidronefrose ou exclusão renal.**

3.1 O tumor se estende ao terço inferior da vagina, mas não atinge a parede pélvica.




3.2 O tumor atinge a parede pélvica e/ou causa hidronefrose ou exclusão renal.



# Câncer Cérvico-uterino

### Estadiamento Clínico - FIGO/UICC



## Estádio 4


**Carcinoma que invade a mucosa da bexiga ou do reto e/ou se estende além da pelve verdadeira.**

4.1 O tumor invade a mucosa da bexiga ou do reto (propagação para órgãos adjacentes).

**Nota:** A presença de edema bolhoso não é evidência suficiente para se classificar o tumor como 4.1.



4.2 O tumor se estende além da pelve verdadeira (propagação para órgãos distantes).



MINISTÉRIO DA SAÚDE