

QUAIS AS PRÁTICAS SEXUAIS MAIS PERIGOSAS ENTRE MULHERES?

- 1.Práticas no período de menstruação (sangue);
- 2.Penetração com os dedos ou mão quando existem cortes, feridas ou queimaduras nas mesmas (sangue e secreção vaginal);
- 3.Xota-com-xota coloca em contato as mucosas genitais, sendo que a fricção(roçado) pode provocar pequenas assaduras (sangue e secreção vaginal);
- 4.Troca de agulhas e seringas não esterilizadas (sangue).

COMO POSSO ME PREVENIR?

1.Sexo oral, penetração - utilizando-se a camisinha ou a luva cirúrgica. Portanto devemos tomar ciência de que não estamos tão imunes assim a Aids, e, é aconselhável que ao praticarmos o sexo não devemos fazê-lo sem a devida proteção antes de chegar aos "finalmentes".




Coordenação Municipal de DSTs/AIDS
Ministério da Saúde - CNDST/AIDS
POA II AIDS II



RUA LUIZ LORÉA 280, CENTRO
FONE:2326239
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
SEGUNDA A SEXTA
DAS 14:00 AS 18:00.

Convênio 909/2000 - CNDST/AIDS

Direitos cedidos pelo Grupo Lésbico da Bahia



SE VOCÊ PENSA QUE PRESERVATIVO É COISA SÓ PARA HOMENS ESTA ENGANADA

LEIA ESTE FOLHETO

Durante a última década a problemática da aids tornou-se uma preocupação generalizada, sendo assim, nos mulheres que fazem sexo com mulheres, não poderíamos ficar ausentes.

Exatamente por isso o GRUPO VIDDA vem trabalhando com pessoas que vivem com hiv/aids, e também com a prevenção das dst's/aids, junto a comunidade lésbica/bissexual com a distribuição de material informativo, preservativos, realização de oficinas de sexo seguro, convida você a conhecer nosso trabalho e a participar destas atividades.

Cada vez mais tem-se perguntado qual o real risco de contaminação no sexo entre mulheres, ou quantas lésbicas já foram contaminadas por troca de seringas no uso de drogas injetáveis? Então o que queremos mostrar neste folheto são algumas dicas de como se prevenir e quais os meios de contaminação pelas dst's/aids.

O QUE É AIDS E HIV?

A Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é a última fase da infecção pelo vírus Hiv (vírus da imunodeficiência humana), tanto as pessoas soropositivas (pessoas que tem em seu organismo o Hiv), como as doentes de Aids podem transmitir o vírus durante sua vida.

Muitas pessoas soropositivas não sabem que são portadoras do vírus Hiv, portanto é aconselhável que se faça o exame para detecção do vírus.

COMO SE TRANSMITE O HIV?

O contágio se dá quando o vírus é transportado para a corrente sanguínea de outra pessoa através de fluidos (líquidos) como: sangue, secreção vaginal, leite materno e esperma. Portanto o contágio não se dá quando compartilha talheres, beijos (no rosto e na boca), aperto de mão, abraço, vaso sanitário. O vírus se transmite por contato sexual sem proteção (camisinha ou luva cirúrgica), compartilhando seringas e agulhas sem esterilizá-las, de mãe para filho no parto ou durante a amamentação e transfusão de sangue (quando o mesmo não é testado anteriormente).

EXISTE RISCO DE CONTAMINAÇÃO NO SEXO ENTRE MULHERES?

Sim, muitas mulheres que fazem sexo com mulheres acreditam que este assunto não lhe diz respeito, acreditando que o fato de só transarem com outras mulheres lhes garante a imunidade, isto é um erro, pensam que só mulheres bissexuais (que também transam com homens) ou aquelas que usam drogas injetáveis é que correm risco, mas todas correm risco, pois o vírus não escolhe a cor, idade, sexo, classe social ou identidade sexual. Qualquer pessoa está sujeita a se contaminar se não se cuidar!