

Como fazer sexo mais seguro




5

Já que no mercado não existem preservativos para sexo seguro entre mulheres, devemos criar nossas próprias barreiras segundo as recomendações a seguir.

Essas barreiras podem ser feitas com luvas cirúrgicas descartáveis, camisinhas sem lubrificantes ou dental gim/dental dan (placa de borracha usada por dentistas para tratamentos de canal, também chamada de "lençol de borracha", encontradas apenas em lojas especializadas em materiais para dentistas).

6

Alguns cuidados na hora das penetrações



Na penetração com os dedos, use dedeiras ou luvas. Se for utilizar instrumentos性uais (consolos, vibradores, cenoura, pepino, embalagem de desodorante ou outros), use sempre camisinha com ou sem lubrificante, ou use a camisinha feminina.


- Nunca esqueça de trocar a camisinha ou dedeira, depois de penetrar na companheira ou em você.
- Nunca penetre o dedo ou instrumento sexual na vagina depois de ter penetrado no ânus, sem trocar a camisinha ou dedeira.
- Evite contato com sangue da outra pessoa, tanto nas práticas sadomasoquistas (aqueles que possam produzir cortes ou perfurações, provocando sangramento), quanto na menstruação.

9

Como fazer estas barreiras


1- Com camisinha

Primeiro corte o bico da camisinha, e depois, faça um corte do lado para que ela fique como se fosse uma toalhinha de borracha.



2- Com luva cirúrgica

Corte os quatro dedos, deixando apenas o polegar (dedão). Em seguida faça um corte do lado para que fique igual à figura ao lado.



Quando usar estas barreiras

Ao praticar tribadismo (roçadinho, lesco-lesco, checa-com-checa, chana-com-chana, xota-com-xota, sabão, esfregadinho), em contato direto com a vagina, use a luva cortada, a camisinha cortada ou o dental gim, como mostra o desenho. Isso vale também para o sexo oral - chupar ou lamber a vagina ou o ânus.



8

Se você usa drogas



10

11

Uma combinação que no início pode aumentar o tesão mas que no final não é muito boa:

- Quem usa drogas, incluindo álcool, maconha, cocaína e crack, tem o seu nível de percepção alterada. Isso diminui a censura e a capacidade decisão, levando a pessoa a perder a noção do risco na hora da transa e esquecer da camisinha.
- Quem usa droga injetável deve usar seringas descartáveis e individuais. Nunca compartilhe a mesma seringa com ninguém.
- Se você cheira, não compartilhe o mesmo canudo. Pode haver ferimento nas mucosas do nariz e você ter contato com o sangue contaminado de outras pessoas.
- Se você fuma cigarro, maconha, crack, haxixe, cachimbo ou charuto, evite o "cachimbo da paz" (várias pessoas fumando do mesmo cigarro), para não contrair o herpes labial.

12