



- a ferida umbilical pode estar seca ou com pus e mau cheiro;
- pode ou não apresentar febre.

#### A doença tem tratamento?

Apesar de ser uma doença muito grave ela pode ter cura quando tratada no início e de maneira adequada. O tratamento deve ser feito de preferência em hospitais que tenham Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

#### ATENÇÃO

Orienta-se que, caso exista alguma criança com essas características, a mesma deve ser encaminhada imediatamente ao hospital mais próximo para atendimento e tratamento e a NOTIFICAÇÃO IMEDIATA deve ser feita à Secretaria de Saúde do seu município.

#### IMPORTANTE

Filhos de mães vacinadas contra o tétano têm proteção somente até o segundo mês de vida.

Ao completar 2 meses de idade a criança deve ser levada ao Posto de Saúde para iniciar o esquema vacinal, definido pelo Ministério da Saúde.

[www.saude.gov.br/svs](http://www.saude.gov.br/svs)

[www.saude.gov.br/bvs](http://www.saude.gov.br/bvs)

e-notifica  
[notifica@saude.gov.br](mailto:notifica@saude.gov.br)

disque saúde  
0800.61.1997

disque notifica  
0800.644.6645



# Tétano Neonatal

## Doença que pode e deve ser evitada

### Informações básicas para o agente comunitário de saúde



### Que é tétano neonatal (TNN)?

É uma doença grave que pode ocorrer do 2º ao 28º dia após o nascimento, que se não for prevenida ou tratada rapidamente pode levar à morte. Normalmente ocorre na primeira semana de vida, por isso é conhecida como *Mal de Sete Dias*.

### Como pode ser evitado o TNN?

Existem alguns cuidados importantes que devem ser tomados para evitar o tétano neonatal:

- A mulher deve estar vacinada adequadamente contra o tétano (ver esquema vacinal adiante);

### A vacinação da mãe é a principal defesa contra o TNN

- O parto deve ocorrer em condições higiênicas, ou seja, assépticas (livre de germes), preferencialmente em ambiente hospitalar;
- Caso o parto seja feito no domicílio, o instrumento para cortar o cordão umbilical deverá ser esterilizado ou fervido por um tempo mínimo de 100 minutos, ou seja, uma hora e 40 minutos;
- As mãos devem ser bem lavadas antes de qualquer cuidado prestado ao recém-nascido.
- A ferida umbilical deve ser lavada durante os banhos e bem secada quantas vezes for necessário;
- Não devem ser utilizadas substâncias caseiras no coto umbilical (umbigo).

O recomendado é usar apenas álcool a 70%. Caso não o tenha, basta manter o coto umbilical limpo e seco.

**Essas medidas evitarão que crianças adoçam e até morram devido ao TNN**

### Quem deve tomar a vacina para evitar essa doença?

- Todas as mulheres de 10 a 49 anos, grávidas ou não.

No caso de grávidas não vacinadas, a vacinação deve ser iniciada assim que ela souber da gravidez.

Para proteger o filho, que ainda está na barriga, a mãe deverá tomar pelo menos duas doses, sendo que a segunda dose deverá ser feita pelo menos vinte dias antes da data provável do parto.

### Quando tomar a vacina?

O esquema em seguida orienta a vacinação de acordo com a história vacinal de cada mulher.

| Esquema de Vacinação                                    |  |   |
|---|--|---|
| História de vacinação prévia contra tétano              | Mulheres em idade fértil   |   |
|   | Gestantes  | Não Gestantes   |
| Sem nenhuma dose  | Iniciar o esquema vacinal o mais precocemente possível com 3 doses, sendo o intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias. | Esquema vacinal com 3 doses, sendo o intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias.             |
| Menos de 3 doses registradas no cartão                  | Completar as 3 doses o mais precocemente possível, sendo o intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias.                  | Completar o esquema vacinal com 3 doses, sendo o intervalo de 60 dias ou, no mínimo, 30 dias. |
| 3 doses ou mais, sendo a última dose há menos de 5 anos | Não é necessário vacinar   | Não é necessário vacinar  |
| 3 doses ou mais, sendo a última dose há mais de 5 anos  | 1 dose de reforço  | Não é necessário vacinar  |
| 3 doses ou mais, sendo a última dose há mais de 10 anos | 1 dose de reforço  | 1 dose de reforço   |

Se o esquema vacinal foi iniciado, mas não pôde ser completado, não é necessário começar tudo de novo e sim apenas completar as doses necessárias para que a mulher e seu bebê fiquem protegidos.

### Onde tomar a vacina?

Nos Postos e/ou Centros de Saúde. É importante lembrar que a vacina é gratuita em todas as unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e que todo dia útil é dia de vacinação.

O cartão de vacina é um documento importante e deve sempre ser conduzido com a pessoa, principalmente na ida à unidade de saúde para receber orientações sobre o esquema vacinal.

### Como o recém-nascido se contamina?

Por meio da utilização de instrumentos inadequados (facas, tesouras, madeira, canivetes e outros) para cortar o cordão umbilical ou ao usar substâncias caseiras para tratar o coto umbilical (tais como borra de café, azeites, óleos, fezes queimadas de animais, pó de fumo, sola de sapato, teia de aranha ou picumã – uma espécie de teia de aranha que pende das chaminés dos fogões que queimam lenha ou carvão –, pena de galinha e outros).

### Como reconhecer quando a doença começa?

A criança apresenta as seguintes alterações:

- Choro constante sem motivação aparente;
- inquietação e ou irritação;
- dificuldade de abrir a boca para mamar;
- boca com formato de bico; dificuldade para respirar;
- coração acelerado;
- repuxamento do corpo, no início ao toque ou manuseio;
- as mãos ficam fechadas e os braços dobrados, tipo posição de boxeador;
- pernas esticadas;
- testa enrugada;

